

Tulajdonságuk

Teste kissé zömök, nyaka közepesen hosszú, csüdje tollatlan, feje és nyaka tollal jól fedett. Taraja és álllebenye sem a hím-, sem a nőivarúnak nincs.

A tojók intenzív tartásnál (fűtött, világított helyen) 6 hetesen, természetes tartásnál 10-12 hetesen kezdenek el tojni, természetes körülmények között tartott tojók tojásai nagyobbak lesznek, és élettartamuk is hosszabb lesz.

Éves tojáshozamuk: 250-300 db, átlagos tojástömeg: 16-17 g.

Gyűrűmérete: 6,5 mm, nagyobb testűeknél 7mm-es

A kifejlett madarak átlagos testtömege: 25-35 dkg.

Japán fürj alfajai, színváltozata

Tenyésztés során különböző színek és alakzatok kerültek elő. Személy szerint két nagy csoportra osztanám az alfajt.

Egyik a tojást adók, másik a hús fajták.

A tojást adók : vadas, isabel vagy itáliai (búza), smoking, csokoládé, ezüst, törpe fehér, fehér-vadas tarka, harlekin

Hús fajták : Texas, angol óriás, szerb óriás, russia.

Japán fürj nemének meghatározása

Japán fürj ivarérettsége a tojóknál a 90. naptól, kakasoknál 120. naptól következik be.

Csibe korban, akár milyen fajtáról van szó, a nemüket szinte meg sem lehet állapítani. Idő múlásával kb.1 hónapos korban, már felismerhetők a szülőik által hordozott nyomok. Szemre vételezéssel a vadas és a fahéj fajtáknál. A tojók melle pettyezett a kakasoké egyszínű. A többi fajtáknál csak felnőtt korban, az egyforma külsejük miatt, a viselkedésük alapján (például a kakas éneke) ismerjük meg.

Harmadik megoldásként (türelmet igényel!), a madár kloákának környékét addig simogatjuk ujjunkkal, míg megduzzad, és végül óvatosan két oldalról nyomjuk meg.

A kifolyt fehér színű habos váladék, csak kakasnál fordul elő, tojónál nem. Minden fiatal kakasnál a széklet kíséretével egy fehér váladék is mellette van.



Tartás, elhelyezés:

A japánfürjnek viszonylag kicsi a helyszükséglete, 1 négyzetméteren 10-12 madár is tartható, de minél nagyobb a helyük annál jobban érzik magukat!

Viszonylag jól repülnek, ezért ketreccben ajánlatos tartani őket. Tojófészeknek egy kisebb kartondoboz is, szénával kibéelve megfelel.

Helyezzünk egy kis tálkába homokot nekik, imádnak fürdeni benne.

Ha a tojásokat keltetni szeretnénk 1 kakashoz 2-3 tojót tartunk, így a kelési eredmény 70-80 %-os lesz.

Tartás feltételei:

- természetes fény biztosítása (nyáron a tűznaptól óvjuk a fürjeket)
- állandó friss levegő biztosítása
- rosszul szigetelt helyen, tartós (nappali) 2 C°, (éjjel) -2 C° fok alatt, alkalmasszerű fűtése a megengedett 10-14 C° fokig.
- hirtelen hanghatás kerülése
- hirtelen meglepetés szerű mozdulat kerülése

A fürjkr?

- friss víz és természetes vitaminpótlás (almaecet, kamillatea)
- gazdag élelmiszer választék és természetes fehérje és vitaminpótlás
- homok+zeolit keverék fürd? biztosítása
- rendszeres takarítás (minimum havonta nagytakarítás és fert?tlenítés) elhullás vagy fert?zés esetén gyakrabban
- minden küls? él?lényt kizárni és megszüntetni (rések, repedések megszüntetése)
- más idegen fajtájú madárral ha lehet ne tartsuk közösen, azt külön boxban tartsuk (ezzel fert?zést, vagy nem kívánt eseményt el?zhetünk meg)

Forrás: www.japanfurj.webatu.com oldalról.